

INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE *IPS SEXDENTATUS* EN EL MONTE BALDÍOS DE NIEBLA (T.M. NIEBLA - HUELVA)

**Ángel Carrasco Gotarredona¹; Sixto Rodríguez Reviriego²; José Ángel Redondo Noval²;
José Manuel Ruiz Navarro²**

¹ Departamento de Equilibrios Biológicos. Servicio de Gestión Forestal Sostenible. Dirección General de Gestión del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

² Equipo de Equilibrios Biológicos. Red de Daños y Equilibrios. Gestión de Redes. División de Sostenibilidad y Biodiversidad. EGMASA.

RESUMEN:

La realización de tratamientos selvícolas de mejora en el monte de Baldíos de Niebla (Huelva) contempla la eliminación de pinos, a raíz de lo que se detecta una progresiva muerte de los mismos asociada a la presencia de *Ips sexdentatus*.

Tras tener conocimiento, en el mes julio de 2008, de la mortandad que se venía produciendo de pinos piñoneros en el monte Baldíos de Niebla, donde se realizan mejoras selvícolas, se decide eliminar los pies afectados. Se emplea una astilladora usada en los trabajos selvícolas desarrollados en la zona afectada, para así poder reducir la población de perforadores.

El día 17 de septiembre, como siguen apareciendo pies secos, se decide realizar una visita con personal técnico de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Agentes de Medio Ambiente a la zona afectada. Se identifica in situ la presencia de *Ips sexdentatus* y se recoge información a fin de poder localizar los focos en los que se detecta la presencia de este perforador.





Figura 1.- Localización del Monte Baldíos de Niebla en la provincia de Huelva.

Simultáneamente se inicia el protocolo de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (FIFO) que permite la toma y envío de muestras al laboratorio de referencia designado para estos casos (Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva) para que confirme la identidad del agente asociado a los daños (*Ips sexdentatus*).



Se localizan, a finales de septiembre, un total de 7 focos de *Ips sexdentatus* en los que, aunque se ha procedido a la eliminación de aproximadamente 180 pies, han vuelto a aparecer nuevos pies secos. Los focos detectados se encuentran a una altitud de 200–250m afectando únicamente a *Pinus pinea*.



El día 09/10/08 se realiza una nueva visita en la que se obtienen adultos inmaduros dentro de la corteza. Por ello, se puede deducir, que la plaga esta terminado el desarrollo de la última generación, responsable de éstas ultimas muertes de pinos.

La identificación del escolítido responsable de los daños por parte del laboratorio de referencia confirma que corresponden a *Ips sexdentatus*, aunque señala que su tamaño es particularmente pequeño.

De esta manera se puede confirmar la presencia en la provincia de Huelva de *Ips sexdentatus* en el monte "Baldíos de Niebla" (T.M. Niebla).

