


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 2 de agosto de 2024


Los modelos consultados prevén la presencia de masas de aire africano sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para el día 2 de agosto. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste de la Península, 10-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el centro y este peninsular y las islas Baleares, y 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, noroeste, norte y noreste peninsular y el archipiélago canario. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre casi toda la superficie de la Península y los archipiélagos balear y canario a lo largo del día. Además, prevé que se produzca deposición húmeda sobre la zona de los Pirineos y las islas Baleares.

El modelo MONARCH prevé la presencia de masas de aire africano en superficie sobre la Península y las islas Canarias para el día 2 de agosto. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste de la Península, 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el centro y este peninsular y las islas Canarias, y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, noroeste, norte y noreste peninsular.



Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo MONARCH para el día 2 de agosto de 2024 a las 00h y 12h UTC. © Barcelona Dust Regional Center.


El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Baleares para el día 2 de agosto. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 1-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste de la Península, 1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este peninsular y las islas Baleares, y 1-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, centro, noroeste, norte y noreste peninsular.



Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 2 de agosto de 2024 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.


El modelo NAAPs no estaba actualizado en el momento de redactar este informe.

Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén la presencia de masas de aire africano sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para el día 2 de agosto. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste de la Península, 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, centro, este, norte y noreste peninsular y las islas Baleares, y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste peninsular y las islas Canarias.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) para el día 2 de agosto de 2024 a las 00 y 12h. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE RC; <http://sds-was.aemet.es>), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; <http://www.aemet.es/>) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, <https://www.bsc.es/>).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran el transporte de masas de aire africano en altura sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias a lo largo del día 2 de agosto, favorecido por las altas presiones predominantes sobre el Mediterráneo y la borrasca situada sobre la Península y Marruecos.




Carga total de polvo (mg/m²) predicha por el modelo SKIRON para el día 2 de agosto de 2024 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 2 de agosto de 2024 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre casi toda la superficie de la Península y los archipiélagos balear y canario a lo largo del día 2 de agosto. Además, prevé que se produzca deposición húmeda sobre la zona de los Pirineos y las islas Baleares.



Depósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 2 de agosto de 2024 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 2 de agosto de 2024 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 1 de agosto de 2024

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.